

Día mundial del sida 1.Dic.2012


Infección por VIH y Sida en Aragón: RESUMEN datos Epidemiológicos

Fuente: Registro de casos de sida de Aragón. Dirección General de Salud Pública
<http://www.aragon.es/vigilanciaepidemiologica>

1. REGISTRO DE CASOS DE SIDA


Desde el año 1985 hasta 30 de junio 2012 se han notificado **1.630 casos** de sida en Aragón (tasa de incidencia acumulada de 121,1 casos por 100.000h).

Casos de sida por año de diagnóstico 1985-2012



- Nivel máximo de **incidencia** en 1994 (ampliación de la definición de caso de SIDA con inclusión de tuberculosis pulmonar)
- Desde 1996 **descenso**, que aún continúa coincidiendo con la extensión de las **terapias antirretrovirales**.
- Tasas de incidencia: 1994: 12,2/100.000 hab -- 2011: 1,8/100.000


Tasas de incidencia en Aragón. 1986-2012



Fallecimientos


Se han notificado un total de 950 **defunciones** (tasa de letalidad del 58,4%) y una tasa de mortalidad de 70 por 100.000 habitantes.

Número de fallecimientos por año de defunción 1985 a 2012



Distribución por sexo.


El 77% de los casos son varones con una razón hombre-mujer de 3,4.



Distribución por grupo de edad


El 64,8% está en el de 25-39 años, y el 23,7% en el de 40-59 años.

La tasa específica por grupos de edad muestra una mayor incidencia en el grupo de edad de 25-39 años, seguida del grupo 40-59 y de 13 a 24 años.



Distribución por categoría de transmisión

A lo largo de la epidemia en Aragón, el 55,4% son UDVP, el 25,5% transmisión heterosexual, desconocida el 7,6% y transmisión homo/bisexual el 7,7%.



Conclusiones

- **La incidencia anual de los casos de sida está estabilizada**, los casos son sólo la **punta del iceberg**. Para conocer la evolución real de la epidemia, desde el año 2008 se ha puesto en marcha en Aragón el **Sistema de Información de Nuevos Diagnósticos por VIH**.
- Se sigue observando un **incremento de la edad media al diagnóstico**. A ello probablemente ha contribuido la efectividad de los tratamientos antirretrovirales administrados a los portadores del VIH, retrasando la edad de aparición del sida.
- En los últimos años se observa un **incremento paulatino de casos debidos a prácticas heterosexuales de riesgo**, suponiendo ya el 54,2% de los nuevos casos de sida en el 2011.

Resumen CASOS. 1er Semestre 2012

- Se han diagnosticado 10 casos nuevos en los 6 primeros meses de 2012 (24 en los 12 meses de 2011).
- Los 10 casos se notificaron en Zaragoza.
- 1 fallecimiento.
- Sexo: 9 hombres / 1 mujer.
- Edad: 3 de 25-39 años, 6 de 40-59 años y 1 mayor de 60. Edad media 46,8 ±9,5 años (rango de 35 a 65).
- Transmisión: 6 son por prácticas heterosexuales de riesgo, 2 son usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) y 2 casos son por prácticas homosexuales de riesgo.
- Enfermedad indicativa de sida más frecuentes: Neumonía, tuberculosis y candidiasis esofágica.
- Enfermedad asociada: 1 presentó Hepatitis C.
- 4 de los 10 casos declarados son extranjeros.

2. NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN ARAGÓN


Desde el año 2008 hasta 30 de junio 2012 se han notificado **477** casos de nuevos diagnósticos en Aragón.

Las tasas de nuevos diagnósticos de VIH en Aragón se mantienen estables en estos 4 años y son similares a las de otras CCAA.


Distribución de los nuevos diagnósticos de VIH por sexo



El **grupo de edad** de 25-39 años representa el 51,2% de los nuevos diagnósticos, seguido del grupo de 40-59 años (33,8%).




Los patrones epidemiológicos de **transmisión** del virus han cambiado. Hoy el VIH se transmite mayoritariamente por vía **sexual**. La práctica de riesgo heterosexual es la más frecuente en ambos sexos.




La mitad de los nuevos diagnósticos ocurre en personas **extranjeras** esto subraya la necesidad de diversificar los programas de prevención para adaptarlos a las necesidades de este colectivo, social y culturalmente muy heterogéneo, y especialmente vulnerable.

Nuevos diagnósticos según procedencia



El 50% de los nuevos diagnósticos presentan un retraso importante: tenían ya una inmunodepresión grave (CD4 <500 células/μl), a pesar de que la prueba del VIH es gratuita y confidencial para todos.



Resumen NUEVOS DIAGNÓSTICOS. 1er Semestre 2012

- 51 nuevos diagnósticos en 6 primeros meses de 2012 (98 en el 2011)
- 44 Zaragoza. / 6 Huesca. / 1 Teruel.
- 4 fallecimientos.
- Sexo: El 72,5% (37) hombres y el 27,5% (14) mujeres.
- Edad: 52% (26) en grupo 25-39 años, 34% (17) al de 40-59 años.
- Procedencia: El 47,1% (24) son españoles.
- Transmisión: La práctica de riesgo heterosexual es la más frecuente en ambos sexos con un 56,9%, la práctica de riesgo homosexual con un 9,8%, los usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) con un 15,7%, 1 caso es por transmisión materno-fetal y no se ha podido constatar la causa en un 15,7%.
- Nivel de linfocitos CD4: Un 47,4% de los diagnósticos se hacen con retraso, presentan cifras inferiores a 350 células/μl.