

¿Qué es el tratamiento anticoagulante oral?

Este tratamiento incluye varios fármacos que interfieren en la coagulación de la sangre **para tratar o prevenir las trombosis y embolias.**



¿Quién indica el tratamiento?

Lo prescribe su médico especialista o de Atención Primaria de forma ambulatoria o durante un ingreso hospitalario.

Complicaciones del tratamiento con ACODs

La principal es el sangrado o hemorragia, que se relaciona con sobredosificación del fármaco.

Las hemorragias más frecuentes son:

- Sangrado leve por nariz o encías.
- Hematomas en número o tamaño desproporcionado al golpe recibido.
- Hematuria (sangre en orina) sin dolor ni aumento de la frecuencia de micciones.
- Siempre es ANORMAL la pérdida de sangre con las heces o menstruaciones abundantes.

Ante un sangrado abundante, espontáneo o tras un traumatismo, debe acudir al servicio de URGENCIAS indicando que toma tratamiento anticoagulante con ACODs.

¿Tienes alguna duda o consulta?

CONTACTO



Teléfono del hospital 976 76 55 00

Citaciones consulta médica (Hematología):

Ext. 142790

Consulta de enfermería (Hematología):

Ext. 142470

Urgencias Hospital U. Miguel Servet:

C/ Gonzalo Calamita s/n, Zaragoza.



informacion.sector2@salud.aragon.es

Puede consultar también sus dudas sobre su tratamiento anticoagulante en su **centro de salud.**

Documento elaborado por Laura Moralejo Cubero (supervisora Laboratorio y consultas Hematología). Grupo multidisciplinar de la enfermedad tromboembólica y anticoagulación del HUMS.

MÁS INFORMACIÓN



Página Web Sector Zaragoza II



Consejos pacientes anticoagulados



CONSEJOS A PACIENTES SOBRE

Tratamiento con anticoagulantes orales directos

(ACODs)
PRADAXA®
XARELTO®
LIXIANA®
ELIQUIS®



Servicio de Hematología y Hemoterapia

Consulta médica HEMOSTASIA, 2a planta CCEE

Consulta enfermería HEMOSTASIA: 4a planta CCEE

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

P.º Isabel la Católica, 1-3, 50009 Zaragoza



¿Cuáles son los anticoagulantes orales de acción directa (ACODs)?

En España tenemos 4 fármacos: Pradaxa® (dabigatrán), Xarelto® (rivaroxabán), Lixiana® (edoxabán) y Eliquis® (apixabán)

- Dos presentaciones de Eliquis®: comprimidos de 2'5 mg y 5 mg.



- Tres presentaciones de Pradaxa®: cápsulas de 75 mg, 110 mg y 150 mg.



- Dos presentaciones de Lixiana®: comprimidos de 30 mg y 60 mg.



- Tres presentaciones de Xarelto®: comprimidos de 10 mg, 15 mg y 20 mg.



Las dosis de Eliquis® y Pradaxa® se toman 2 veces al día (mañana y noche), y las de Xarelto® y Lixiana® se toman 1 vez al día. Táchela después en el calendario.

Xarelto® debe tomarse con alimentos.


Eliquis®, Pradaxa® y Lixiana® pueden tomarse con o sin alimentos.

¿Quién realiza el seguimiento del paciente?

Puede llevarlo a cabo el servicio de hematología del hospital, o el equipo sanitario del Centro de Salud.

Se realizará una analítica cada 6-12 meses para evaluar su función renal y hepática.

¿Cuánto dura el tratamiento?



La duración depende de la enfermedad para la que se le haya indicado el tratamiento anticoagulante.

Puede variar desde varios meses a un tratamiento indefinido.

Embarazo y anticoagulación

Si se queda embarazada durante el tratamiento anticoagulante, **comuníquelo a su médico inmediatamente.**

Cirugía y pruebas diagnósticas invasivas

Si va a ser sometido a una **cirugía programada**, incluso **cirugía menor** (extracciones dentarias) o **pruebas diagnósticas invasivas** (endoscopias, biopsias), debe comunicarlo a su médico al menos una semana antes.

PAUTAS A SEGUIR

en la toma de los ACODs

- **Si olvida una dosis**, y se acuerda hasta 6 h antes (en el caso de Eliquis® y Pradaxa®), o hasta 12 h antes (en el caso de Xarelto® y Lixiana®) tómela, aunque sea más tarde de su hora habitual. Si lo recuerda pasando más tiempo, tome la que corresponda al día actual, pero **NUNCA TOME EL DOBLE DE DOSIS** para compensar.
- **Si vomita o tiene diarrea inmediatamente después de la toma**, repita la dosis. Pero si ha pasado más de 1 h de la toma del fármaco, no repita una nueva dosis.
- Eliquis® y Xarelto® contienen lactosa. Comuníquelo si tiene intolerancia a la lactosa.
- **Si dolor o fiebre**: puede tomar paracetamol. Evite la aspirina y los antiinflamatorios como el ibuprofeno.
- **No interrumpa el tratamiento anticoagulante por su cuenta ni se automedique** con nuevos medicamentos con fármacos sin receta y/o productos de herboristería.
- **PROHIBIDAS** las inyecciones intramusculares.
- **No tome alcohol y siga una dieta equilibrada**